

Criteri diagnostici per la Degenerazione Corticobasale (CBS)

Litvan et al., Mov Disord 2003;18:467-86

Criteri diagnostici

Rigidità più un segno corticale (aprassia, perdita sensoriale corticale o arto alieno),

OPPURE

rigidità asimmetrica, distonia e mioclono focale riflesso.

Decorso cronico progressivo, esordio asimmetrico;
presenza di segni corticali (aprassia, perdita sensoriale corticale o arto alieno)

E

Disturbi del movimento - sindrome ipocinetica rigida resistente a levodopa, e distonia dell'arto; mioclono focale.

Criteri che escludono CBS

- Esordio precoce della demenza
- Precoce paralisi dello sguardo verticale
- Tremore a riposo
- Severo disturbo autonomico
- Risposta sostenuta a levodopa
- Lesioni evidenti con strumenti di imaging compatibili con altra condizione medica

Caratteristiche dei sintomi clinici

RIGIDITÀ: facilmente rilevabile senza rinforzo.

APRASSIA: più che semplice uso dell'arto come oggetto; chiara assenza di deficit cognitivo o motorio.

PERDITA SENSORIALE CORTICALE: asimmetrica, con sensazione primaria preservata.

FENOMENO DEGLI ARTI ALIENI: più che semplice levitazione.

DISTONIA: focale nell'arto, presente a riposo all'inizio.

MIOCLONO: mioclono riflesso che si diffonde oltre le cifre stimulate.