

Criteri diagnostici per la demenza frontotemporale, variante comportamentale (bv-FTD)

Rascovsky et al., Brain 2011;134:2456–77

bv-FTD Possibile

- Core Criteria*
- Almeno 3 dei seguenti sintomi comportamentali/cognitivi:
 - Disinibizione comportamentale (esordio nei primi 3 anni di malattia).
 - Apatia o inerzia (esordio nei primi 3 anni di malattia).
 - Perdita di empatia o compassione (esordio nei primi 3 anni di malattia).
 - Comportamenti perseverativi, stereotipati, o compulsivi/ritualistici (esordio nei primi 3 anni di malattia).
 - Iperoralità e cambiamenti nella dieta.
 - Profilo neuropsicologico caratterizzato da deficit esecutivi, e relativo risparmio delle funzioni mnesiche a visuospatiali.

bv-FTD Probabile

- Core Criteria* .
- Soddisfatti i criteri per bv-FTD possibile.
- Importante impatto funzionale
- Risultati dell'imaging:
 - A. Atrofia frontale e/o temporale anteriore al RM o TC.
 - B. Iperperfusione o ipometabolismo frontale e/o temporale anteriore alla PET o SPECT.

bv-FTD con chiara degenerazione lobare frontotemporale

- Soddisfatti i criteri per bv-FTD (possibile o probabile).
- Evidenze istopatologiche di degenerazione lobare frontotemporale.
- Presenza di una mutazione patogena nota.

* Deficit comportamentale e/o cognitivo ingravescente, confermato dall'osservazione o dalla storia clinica, ricostruita con un informatore affidabile.